Prefacio

Dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales, el Parque Nacional Natural Tayrona siempre ha sido considerado como un emblema notable de la gestión de las diferentes administraciones, debido a que todos los colombianos que lo visitan guardan su afecto por él en el lugar más fresco de la memoria. Pero para la mayoría de estos viajeros en descanso, el recuerdo reposa sobre hermosos paisajes de sol y playa silvestres, un clima ardiente de brisas húmedas inimaginables y una experiencia con gente caribe que brinda su hospitalidad en mitad de refugios aislados por enormes tramos de selvas entre deciduas y húmedas.

Es indudable el vigor de una vivencia personal a la sombra de sus palmeras, bajo el agua de los arrecifes o al recorrer sus múltiples maravillas culturales, pero considera la actual administración del Sistema de Parques que falta brindarle al público información más profunda acerca de su biodiversidad, de modo que se enriquezca su conocimiento y se ganen mejores defensores frente a la alta sensibilidad y vulnerabilidad ecológicas que lo caracterizan. Estamos convencidos que pocas personas saben cuántas aves surcan sus montañas o cuál es el trabajo de cada una de ellas a lo largo del litoral, cual es la composición botánica que puede encontrar en los senderos y mucho menos quienes son los vecinos sumergidos en el piso de abajo de las bahías.

Por esta razón, simultáneamente con diversas gestiones puestas en marcha para asegurar un ordenamiento adecuado

del parque con prestadores de servicios, instituciones públicas, organismos no gubernamentales, propietarios de predios y otros ministerios, se viene avanzando en mejorar la experiencia educativa y el servicio al visitante con el apoyo de agencias de cooperación, embajadas y proyectos internacionales.

En este contexto, vale la pena destacar los esfuerzos efectuados para sensibilizar al público regional, nacional e internacional a partir de procesos de comunicación y divulgación de manera que no solamente se logre una nueva mirada de la importancia del parque, sino un cambio de actitud en la forma de aprovechar dentro del concepto de sostenibilidad, las opciones y alternativas que ofrece como riqueza natural.

Dirigido a un público diverso, no especializado pero interesado en conocer otros aspectos más allá de los comúnmente ofrecidos en estos lugares, el convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente y La Unión Europea para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, presentan a continuación una colección de libros guías, los cuales constituyen uno de los resultados que busca presentar de una manera sencilla y didáctica la diversidad del Parque en relación con las especies más sobresalientes en cuanto a las plantas, aves y organismos marinos que posee y que no han sido suficientemente divulgados a las personas que frecuentan el área.

Este esfuerzo técnico de la Fundación Ornitológica Sierra Nevada, la universidad Tadeo Lozano y de algunos profesionales de la Universidad del Magdalena, es una contribución más al desarrollo de una cultura amable con la biodiversidad y un testimonio incuestionable de que el esfuerzo por cuidar el parque para todos los colombianos se lo debemos a su hermosa naturaleza.

Juan Carlos Riascos de la Peña
Director General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales

Presentación

El proyecto **"Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta"**, convenio de cooperación internacional entre la **Unión Europea** y **Colombia**, a través del **Ministerio del Medio Ambiente**, tiene como finalidad promover un manejo ecológicamente apropiado de los ecosistemas y de su biodiversidad para lograr la conservación ambiental y, al mismo tiempo, el bienestar de las poblaciones locales.

Entre sus actividades ha buscado fortalecer y afianzar los procesos y las relaciones interculturales, es decir entre los principales grupos humanos del área, campesinos, indígenas y poblaciones urbanas para, de esta forma, poder llegar a un desarrollo en armonía con la naturaleza de la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Este proyecto ha intentado igualmente fortalecer las instituciones, principalmente públicas, y las comunidades del área en cuanto al manejo sostenible y adecuado, no destructivo, de los recursos naturales realizando una serie de actividades específicas para validar y replicar en otras áreas.

En este marco, y a través de acuerdos con la *Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales* (UAESPNN) a nivel nacional y de su Dirección Territorial de la Costa Atlántica, se ha realizado esta colección de tres libros guías sobre las aves, los organismos marinos y las plantas más importantes, sobresalientes y reconocibles del **Parque Nacional Natural Tayrona**.

Cada guía tiene en su interior la descripción de 100 especies representativas del parque.

No se trata entonces de guías exhaustivas, con la presentación de todas las especies encontradas en el área protegida, sino de publicaciones realizadas con lenguaje sencillo, entendibles a todos, dirigidas principalmente a no especialistas sobre el tema, turistas y visitantes que tengan la inquietud de conocer más sobre la riqueza natural de Colombia. Sin embargo, aunque escritas en un lenguaje accesible a todos, no se ha renunciado a mantener una clara rigurosidad científica en los textos.

Esperamos que estos trabajos permitan un acercamiento más extenso y profundo a la naturaleza del Parque Tayrona, quizás demasiadas veces considerado exclusivamente como un balneario y que, sin embargo, conserva importantes elementos de la diversidad biológica de la Sierra Nevada de Santa Marta, del cual el parque Tayrona es el extremo marino-terrestre. Quizás valga la pena recordar como el Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los últimos refugios de la costa atlántica Colombiana donde se conservan las grandes formaciones de bosques, poblaciones de animales marinos y terrestres y los antiguos signos de la presencia humana de época prehispánica de las tierras bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La codirección, los técnicos y el personal del proyecto "*Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta*", los autores de los textos y las instituciones que han trabajado y colaborado en la realización de estos libros desean que estos puedan servir de incentivo, de estímulo para profundizar el conocimientos de la naturaleza y diversidad natural de Colombia y volver este interés un factor más que garantice una adecuada protección y conservación de los recursos naturales de estas áreas protegidas.

María José Durán
Codirectora Nacional

Andrés Visinoni
Codirector Europeo

Proyecto "Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta"

Aves

Parque Nacional Natural Tayrona

"Las 100 Especies más Sobresalientes"

Agradecimientos

Deseamos agradecer en su labor de revisión de textos al grupo de FOSIN, Fundación Ornitológica de la Sierra Nevada, compuesto por Francisco Troncoso, Walberto Naranjo y Ralf Strewe.

También un reconocimiento a los valiosos aportes de Carlos Martínez Ruíz, de la Universidad de Sao Luis de Marañao, Brasil, de María José Duran, codirectora del proyecto "Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta" y Armando Calvano, de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.

Finalmente un reconocimiento a Juan Carlos y Guillermo Torres por la paciencia y el esmero en la realización, en muy poco tiempo, de los dibujos, y a María Alejandra Conde por el profesionalismo y la calidad de su diseño gráfico para los Libros-Guía.

Parque Nacional Natural Tayrona
"Biodiversidad y Cultura"

Ubicación y reglamentación

El Parque Nacional Natural Tayrona está ubicado al norte del departamento del Magdalena, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), 11°21' y 11°16' latitud norte y 73°53'-74°13' longitud oeste. Comprende desde Punta Venado en Taganga hasta la desembocadura del río Piedras, abarcando 15.000 hectáreas de territorio (12.000 ha terrestres y 3.000 ha marinas). Hace parte del Sistema de Parques Nacionales desde 1964, cuando fue declarado Parque Nacional Natural con el objetivo de conservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas nacionales con fines científicos educativos, recreativos y estéticos.

Integrando las 46 áreas protegidas que maneja la **Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales**, UAESPNN (9% del territorio nacional), constituye uno de los Parques más visitados del país (en los últimos 10 años han ingresado aproximadamente un promedio de 61.400 visitantes anuales entre nacionales y extranjeros). Por su importancia biológica y cultural fue incluido en 1982 en la declaración de Reserva de la Biosfera de la Sierra Nevada de Santa Marta por la organización de la Naciones Unidas, UNESCO. *Un detallado mapa sobre los accesos y los servicios autorizados prestados en el Parque está contenido en la guía.*

Historia

El nombre Tayrona tiene su origen por los antiguos habitantes prehispánicos del valle del río Don Diego de la Sierra Nevada conocidos bajo el nombre tribal TAYRO. Con el transcurso del tiempo se designó Tayrona a todos los habitantes de la región.

Actualmente el Parque congrega importantes sitios que atestiguan la presencia humana desde épocas remotas; terrazas, viviendas y caminos internos se extienden hacia la periferia comunicándolo con otras poblaciones en la Sierra y el litoral (bahías), lo que en su momento conformó un sistema de caminos que posibilitaban mantener redes para el intercambio de productos agrícolas, de caza y de pesca. El Parque en general es considerado un lugar sagrado para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos). "Pueblito o Chairama", ubicado dentro los limites del Parque, fue la población más importante de la región para la cultura indígena Tayrona, por tal motivo fue declarado Patrimonio Nacional en 1969 y Monumento Nacional en 1995.

Características ambientales

El PNNT cubre altitudes desde 0 msnm hasta 950 msnm, posee un clima cálido de 25°C a 30°C. Está influido por los vientos Alisios del nororiente que soplan con fuerza entre diciembre y abril presentándose escasez de lluvias y un ambiente drásticamente seco. Entre los meses septiembre a noviembre los vientos bajan de intensidad y aparecen las lluvias. La influencia de los vientos causa un movimiento de migración vertical de aguas profundas y frías del océano en un fenómeno conocido como *"surgencia"*, el cual enriquece las aguas de nutrientes y permite la presencia de una alta diversidad de especies marinas.

La marcada diferencia en el gradiente de pluviosidad anual desde el occidente (cerca de Santa Marta 500 mm de promedio anual) hacia el oriente (río Piedras 2.000 mm anuales)

se refleja en un aumento paulatino del caudal de las diferentes quebradas y el cambio del bosque seco tropical a húmedo tropical. La transición de ambientes en un área relativamente reducida hace posible la presencia de un mosaico de ambientes marinos y terrestres, conteniendo muestras representativas de diferentes ecosistemas; diversos tipos de bosque tropical (seco, húmedo y nublado), matorral espinoso, manglares, acantilados, playas arenosas, arrecifes coralinos, pastos marinos y lagunas costeras, constituyendo una de las áreas mejor conservadas del Caribe colombiano. *Para facilitar la orientación y ubicación de estos ambientes en el Parque Tayrona, un mapa detallado de la distribución de los principales ecosistemas ha sido puesto en la guía.*

El Parque Tayrona es una unidad fisiográfica de reciente formación geológica compuesto por rocas metamórficas y un batolito de rocas ígneas, es decir volcánicas. Este batolito divide al Parque a la altura del Cabo San Juan del Guía en dos sectores:

1. Occidental: compuesto por una serie de pequeñas ensenadas y bahías con playas internas que se sumergen abruptamente en el mar; Granate, Concha, Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto, Guachaquita y Palmarito. Cada bahía se abre en diferente ángulo hacia el mar, de tal manera que recibe en forma diferente los vientos, las corrientes y el oleaje. Son áreas de aguas tranquilas, poco profundas y con mucha luz permitiendo el desarrollo de formaciones coralinas, así mismo, de praderas de pastos marinos que atenúan las corrientes y evitan la erosión de la costa, está ultima formada en gran parte por fuertes acantilados que se intercalan con pequeñas playas arenosas.

   La parte terrestre está conformada por bosque seco y espinoso tropical. Se trata de las áreas con este tipo de bosques mejor conservadas de Colombia, donde abundan cactus y árboles que en la época seca despojan las hojas dándole al paisaje un cambio significativo de una época a otra.


Pequeñas quebradas aportan agua dulce a las comunidades animales y vegetales y a las bahías; en la desembocadura se forman lagunas costeras (madreviejas) generalmente rodeadas por manglares (árboles anfibios que resisten la salinidad del mar).

2. Oriental: formado por extensas playas de arena casi rectas con abundantes rocas grandes, comprende El Cabo San Juan del Guía, La Piscina, Arrecifes, Arenilla, Cañaveral y Los Naranjos (desembocadura del río Piedras). Este sector se encuentra expuesto a un violento oleaje y fuertes corrientes paralelas a la playa. En el área presenta bosque húmedo tropical con árboles grandes donde predomina el Caracolí (*Anacardium excelsum*). En las playas desovan 4 de las 6 especies de tortugas marinas presentes en el Caribe.

Flora y fauna

La diversidad de organismos marinos: 205 especies de esponjas, 700 especies de moluscos, 96 especies de anélidos, 417 especies de crustáceos, 56 especies de corales pétreos, 39 de octocorales (corales blandos) y 9 de corales negros, más de 376 especies de peces, 4 especies de tortugas marinas, 5 especies de pastos marinos, 4 especies de manglares, 350 especies de macroalgas, entremezclados con muchas especies de bacterias, hongos y gran variedad de seres no conocidos. En el Parque se encuentran 7 especies **endémicas** en el área marina; 5 especies de algas *(Cladophyllum schnneterii, Champiocolax sarae, Avranvillea sp., Dyctiopteris sp., Grateloupiocolax colombiana*), un molusco *(Pachybathron tayrona*) y un pez (*Priolepis robinsi).*

La parte terrestre ha sido menos estudiada sin embargo su importancia radica en las 765 plantas superiores reportadas, así como 108 especies de mamíferos, alrededor de 400 especies de aves, 33 réptiles y 15 de anfibios. Entre los mamíferos se menciona la presencia del zorro chucho (*Didelphis marsupialis*), el perezoso *(Bradypus variegatus*), el osito hormiguero (*Tamandua mexicana*), primates como el mono aullador o cotudo (*Alouatta seniculus*), el mico nocturno o marteja (*Aotus lemurinus*) y el mico maicero (*Cebus albifrons*), armadillo (*Cabassous centralis*), felinos como el tigrillo (*Leopardus pardalis*) y , ha sido señalado aunque muy escaso, el jaguar (*Panthera onca*), venado (*Mazana americana*), el zaíno *(Tayassu tajacu*) y la guartinaja *(Agouti paca).* Bastante frecuente es observar en los caminos del Parque las iguanas (*Iguana iguana*) y algunas espacies de serpientes, entre la cuales se destaca la boa (*Boa constrictor*).




Áreas Actuales del Sistema de Parques Nacionales Naturales

Fuente: El Sistema de Parque Nacionales Naturales de Colombia (1998)

Mapas

Parque Nacional Natural Tayrona

"Las 100 Especies más Sobresalientes"



Accesos y Servicios

- Puestos de Acceso
- Puestos de Información y Control
- Zona de Parqueaderos
- Transporte
- Arrieros
- Zona de Camping
- Ecohabs
- Museo y Ecotienda
- Restaurante




Actividades

- Observación de Aves
- Observación de Organismos Marinos
- Sitios Sagrados Indígenas

Vías

- Troncal del Caribe
- Carretera
- Sendero
- Poblaciones

5 Km.



Ecosistemas Terrestres

- Matorral Espinoso
- Bosque Seco
- Bosque Húmedo
- Bosque Nublado

Ubicación de Especies Representativas

- Halcón Pescador ó Águila Pescadora
  Pandion haliaetus
- Halcón Golondrina, Tijereta ó Gavilán Tijereto
  Elanoides forficatus
- Pavón Colombiano ó Paujil
  Crax alberti
- Cigüeñuela
  Himantopus mexicanus
- Cotorra Cheja ó Cheja Cabeciazul
  Pionus menstruus



- Esmeralda Piquirroja — *Chlorostilbon gibsoni*
- Bobo Punteado — *Hypnelus ruficollis*
- Tucán del Caribe, Tucán Piquihermoso ó Paletón — *Ramphastos sulfuratus*
- Carpintero Real — *Dryocopus lineatus*
- Hormiguero Pechiblanco — *Myrmeciza longipes*
- Saltarín Barbiblanco — *Manacus manacus*
- Cucarachero Chupahuevos ó Carraquero — *Campylorhynchus griseus*
- Turpial Amarillo — *Icterus nigrogularis*
- Azulejo Golondrina — *Tersina viridis*
- Asoma Terciopelo ó Cardenal Pico de Plata — *Ramphocelus dimidatus*

Cómo Observar Aves en el Parque Nacional Natural Tayrona

Para observar aves se requiere normalmente paciencia y tiempo para dedicar a la naturaleza.

Un paseo por el bosque de un parque nacional, las cercas arboladas de la periferia urbana, los jardines públicos nos pueden permitir observar muchas especies de aves, más de la que hubiéramos pensado que pudieran existir en el lugar. Sin embargo, sobre todo, nos permitirá descubrir las formas, los colores, hasta el comportamiento de estos animales y, acercándonos a este mundo, contribuir a la conservación de este patrimonio colombiano lamentablemente amenazado por la caza, el comercio ilegal y destrucción de los ambientes naturales.

El instrumento básico para transformarse en un observador de aves, es el binocular. Existen muchos tipos de binoculares en el comercio: los de tamaño tradicional, los en formato diminuto y muy poco pesados, los monoculares tipo telescopio, etc.

Un binóculo común y corriente 8x30 puede ser el instrumento ideal para observar aves. El número 8 hace referencia a la magnitud de acercamiento del binocular y el número 30 a la amplitud de las lentes para permitir el paso de la luz. Cuanto más alto es el número más acercamiento y luminosidad puede tener el binocular.

Con el tiempo puede familiarizarse con este aparato (usar el binóculo es sencillo pero requiere de una cierta práctica para poder enfocar rápidamente el objeto deseado) y adquirir un binocular más profesional 12x50, quizás el más útil para la observación de aves durante paseos. Los hay más poderosos pero resultan complicados para usar sin trípodes andando en el monte por caminos escarpados o difíciles. En el caso de que se disponga de tiempo y posibilidad de situarse en un observatorio fijo, es recomendable un telescopio terrestre con trípode.

El otro instrumento fundamental del observador de aves es una buena guía de campo para el reconocimiento de las especies. La presente guía de campo sirve para empezar y puede ser útil para casi toda la costa atlántica de Colombia, aunque se limita a presentar solo 100 de las más de 300 especies de aves reportadas en el parque. Cuando sus requerimientos o estímulos de conocimientos aumentan, hay en Colombia una de las guías de aves más completa del mundo: la **"Guía de las aves de Colombia"**, de Hilty y Brown, disponible en muchas librerías del país. Esta guía es particularmente voluminosa por una sencilla razón: Colombia es el país con el mayor numero de especie de aves del planeta, llegando a superar las 1.750. Naturalmente si viaja a otra parte del mundo están disponibles guías para muchos países.

De todas formas recuerde que una regla importante para observar aves es coincidir con sus horas de mayor actividad. La mañana temprano y el atardecer, son las horas mejores para observar aves. Durante las horas más cálidas del día las aves están en lugares protegidos del fuerte sol y reducen sus actividades para ahorrar agua y energía.

Otros consejos:

1. Haga el menor ruido posible para no espantar la vida silvestre.
2. Si quiere observar más de cerca una especie acérquese muy lentamente.
3. Fíjese principalmente en los pequeños detalles de coloración en su plumaje y en la forma del pico tratando de memorizarlos para localizar en la guía la especie observada.
4. Use ropa que se pueda confundir con los colores del ambiente que va a visitar.
5. Pueden atraer las aves poniendo en lugares visibles frutas, semillas, agua y, para los picaflores, agua azucarada.

Con el tiempo irá aprendiendo a reconocer muchas aves por su forma específica de volar o por encontrarse en determinados lugares o, aunque no las pueda observar, por tener un canto característico. Todos estos elementos le permitirán descubrir más de cerca el mundo de las aves y contribuir a la conservación de este patrimonio de Colombia.

Cómo Usar esta Guía

Siendo dirigida a un público no especialista y realizada más bien para fomentar en el Parque Nacional Tayrona un turismo más conocedor, responsable y no exclusivamente de playa, los textos han sido escritos en manera muy sencilla y entendibles a personas neófitas, que por la primera vez se acercan a un conocimiento más especifico de la vida silvestre. Pese a este lenguaje sencillo y entendible, los textos han mantenido la rigurosidad científica que se requiere para informar en manera apropiada.

En la medida de lo posible se han evitado los términos demasiado complejos. Cuando ha sido inevitable usar términos menos comprensibles, han sido puestos en negrilla y pueden encontrar una explicación sobre el significado en el ***glosario*** al final del libro.

Las 100 especies presentadas han sido seleccionadas sobre la base de algunos criterios: facilidad de observarlas, representativas de los varios ambientes naturales del parque y, cuando no fácil de observar, se trata de especies muy características o importantes, etc.

Estamos conscientes que 100 especies no son exhaustivas de la diversidad de la fauna ornitológica del parque pero permiten un primer acercamiento a la observación y conocimiento de las aves. De todas formas para mayor información se puede consultar el listado completo de las aves del Tayrona (*página 87*) realizado por el equipo de FOSIN o consultar otros textos mencionados en la bibliografía.

Para facilitar su reconocimiento las especies están ilustradas dividiéndolas por su distribución en 4 categorías geográficas:

1. Todo el Parque Tayrona
2. Los Ambientes Acuáticos y Marinos
3. El Matorral y el Bosque Seco
4. El Bosque Húmedo y Nublado.

Con los mapas contenidos en la guía pueden orientarse para identificar el área de principal distribución.

Todas las especies se encuentran referenciadas con su nombre popular o común. Estos nombres pueden variar notablemente según la región de Colombia o en los países hispanohablantes. En principio se han adoptado los nombres populares/comunes propuestos en la prestigiosa "***Guía de las aves de Colombia***" de Hilty y Brown pero se han mencionado también otros nombres usuales en el país.

Para facilitar su reconocimiento también se indica la **familia** de pertenencia de la especie y el **nombre científico**, uniforme en todo el mundo (los nombres científicos mencionados con un asterisco (*) están actualizados según las ultimas modificaciones de la nomenclatura científica).


Se menciona la distribución básica dentro del Parque Tayrona. Para facilitar ésta búsqueda, algunas aves están señaladas en el mapa de ecosistemas con algunas convenciones. Sin embargo recuerde que las aves se desplazan periódicamente por varias razones (período de nidificación, disponibilidad de alimentos, movimientos estacionales, etc.) y es posible que se puedan ver algunas especies en áreas distintas de las mencionadas.

El tamaño hace referencia principalmente a las medidas que el observador pueda estimar mirando las aves en su ambiente natural.

Las características/particularidades dan algunos elementos adicionales sobresalientes para permitir un reconocimiento más fácil de la especie, las eventuales diferencias

de los juveniles y de las hembras (cuando poseen coloración o porte distinto), y datos importantes o curiosos sobre su historia natural.

Finalmente algunas convenciones al final de los textos de cada especie resumirán e indicarán rápidamente la facilidad de observarlas *(Común,* muy fácil de encontrar en cada excursión al Parque; *Frecuente,* requiere de recorridos más especializados; *Escasa,* difícil de observar) y durante qué época del año *(Residente,* presente todo el año en el Parque; *Migrador,* presente principalmente durante los meses de septiembre a abril*)*.




Recuerde que algunas especies son comunes de ver y no faltarán en cualquier excursión que realicen en el parque. Otra especies serán más difíciles de mirar y solo con una búsqueda más especifica podrán observarlas. Le sugerimos que, toda las veces que encuentre una de las aves mencionadas en el libro como escasas, informen al personal del Parque sobre el lugar y la fecha de la observación: estas informaciones pueden ser útiles para definir mejor la real distribución de la especies y mejorar la conservación de las mismas.

Aves

Parque Nacional Natural Tayrona

"Las 100 Especies más Sobresalientes"

Aves que se Pueden Observar en Todo El Parque Nacional Natural Tayrona



Tinamú Chico ó Chorola Enana
Cripturellus soui



Familia: TINAMIDAE

Distribución en el parque:
Todo el área

Tamaño: 23 cm

Características/particularidades:
La especie más chica de los tinamúes colombianos. Muchos más fácil oírlos que verlos. Fuertes silbidos con tono en aumento. Casi no vuela: normalmente camina en el bosque. Coloración mimética.

Garcita del Ganado ó Garza Ganadera
Bubulcus ibis



Familia: ARDEIDAE

Distribución en el parque:
Se puede observar principalmente en las áreas ganaderas antes de la entrada al parque.

Tamaño: 35 - 50 cm

Características/particularidades:
En bandadas. Nótese el pico grueso y amarillo. Esta ave, originaria de África y Asia, ha llegado al continente americano en los años 30 del siglo XX. Actualmente está distribuida en casi todo el continente.

Guala Común, Buitre, Zopilote ó Aura Cabecirroja

Cathartes aura



Familia: CATHARTIDAE

Distribución en el parque:
Sobrevuela toda el área

Tamaño: 55 - 65 cm
Envergadura alas de 1.60 -1.80 m.

Características/particularidades:
Se reconoce de los otros buitres por tener la cabeza y el cuello rojizos. Ave carroñera. Localiza los alimentos con la vista y el olfato.

Buitre ó Gallinazo

Coragyps atratus



Familia: CATHARTIDAE

Distribución en el parque:
Común en toda el área

Tamaño: 50 - 55 cm
Envergadura alas 1.40 m.

Características/particularidades:
Ave carroñera aunque puede comer otros alimentos. Gregaria. Cabeza negra y mancha blanca en las primarias.

Águila Barrada ó Gavilán Saraviado Común

Buteo nitidus



Familia: ACCIPITRIDAE

Distribución en el parque:
En toda el área.

Tamaño: 38 - 43 cm

Características/particularidades
Persigue sus presas entre el follaje. Bastante activo.



Gavilán Caminero ó Gavilán Grillero

Buteo magnirostris



Familia: ACCIPITRIDAE

Distribución en el parque:
El halcón más común del parque

Tamaño: 34 - 38 cm

Características/particularidades:
Se puede reconocer los adultos por el capuchón parduzco de la cabeza. En espera de las presas en las ramas medianas de los árboles.



Guaraguaco Común ó Caracara
*Caracara cheriway**



Familia: FALCONIDAE

Distribución en el parque:
Común en toda el área

Tamaño: 50 - 60 cm

Características/particularidades:
Ave carroñera normalmente confiada. En pequeños grupos. Comúnmente en el suelo a los lados de carreteras alimentándose de animales muertos.

Cernícalo
Falco sparverius



Familia: FALCONIDAE

Distribución en el parque:
En toda el área

Tamaño: 23 - 28 cm

Características/particularidades:
Frecuente también en áreas pobladas y orilla de carretera. Vuelo muy rápido.

Pigua ó Halcón Garrapatero
Milvago chimachima



Familia: FALCONIDAE

Distribución en el parque: Frecuente en todos los ambientes del parque

Tamaño: 38 - 46 cm

Características/particularidades: Ave carroñera. Común con el guaraguaco a las orillas de los caminos.

Torcaza Morada
Columba cayannensis



Familia: COLUMBIDAE

Distribución en el parque: Todos los ambientes del parque

Tamaño: 30 cm.

Características/particularidades: Gregaria o solitaria. Arisca. Se posa en los árboles.

Tortolita Común
Columbina talpacoti



Familia: COLUMBIDAE

Distribución en el parque:
Todos los ambientes del parque

Tamaño: 15 cm.

Características/particularidades:
Pequeña. En grupos. Nótese el color castaño a rufo con manchitas negras. Bastante confiada y terrestre.



Caminera Rabiblanca ó Tórtola Colipinta
Leptotila verrauxi



Familia: COLUMBIDAE

Distribución en el parque:
Varios ambientes principalmente secos.

Tamaño: 26 cm.

Características/particularidades:
Ocultas. Terrícola y del sotobosque.



Periquito Bronceado ó Perico Barbianaranjado
Brotogeris jugularis



Familia: PSITTACIDAE

Distribución en el parque:
En todo el parque, también en áreas degradadas.

Tamaño: 18 cm

Características/particularidades:
Verde con manchas naranjadas. En pequeñas y ruidosas bandadas en las copas de los árboles.

Garrapatero Sirirguelo ó Garrapatero Piquiestriado
Crotophaga sulcirostris

Familia: CUCULIDAE

Distribución en el parque:
Bosque seco y áreas pobladas

Tamaño: 28 - 30 cm

Características/particularidades:
Confiado. Vuelo lento y bajo. Frecuente en áreas ganaderas e intervenidas.



Cuco Ardilla ó Ardítero Común

Piaya cayana

Familia: CUCULIDAE

Distribución en el parque: Frecuente en las áreas boscosas secas y húmedas

Tamaño: 45 cm

Características/particularidades: Cola muy larga (30 cm). Esta especie de cuco, a diferencia de otras especies, no parasita los nidos de otras aves. Se mueve entre las ramas con movimientos que lo pueden hacer confundir con las ardillas o pequeños micos. Los polluelos abandonan el nido antes de poder volar.



Lechuza Común

Tyto alba



Familia: TYTONIDAE

Distribución en el parque: Varios ambientes, aun poblados.

Tamaño: 36-38 cm.

Características/particularidades: Nocturna y crepuscular. Gran cazadora de ratones. Puede anidar en viviendas humanas, campanarios u otras edificaciones. Distribuida casi en todo el mundo.

Carrucutá Común
Otus choliba



Familia: STRIGIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y seco

Tamaño: 22 cm.

Características/particularidades: Oculto. Frecuente en pares. Nótese las pequeñas orejas eréctiles.



Guardacaminos Común ó Bujío Común
Nyctidromus albicollis

Familia: CAPRIMULGIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y nublado

Tamaño: 28 cm

Características/particularidades: Terrícola. De noche posado en caminos y carreteras. Al amanecer y al crepúsculo se reconoce por el canto que da origen a uno de sus nombres comunes. Nótese la banda blanca en las **primarias**.





Ermitaño Carinegro
Phaetornis anthophilus



Familia: TROCHILIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque

Tamaño: 12 cm. Pico 3.8 cm

Características/particularidades:
Típicos picaflores del sotobosque. Nótese las largas **timoneras** centrales con ápice blanco.



Amazilia Colirrufo ó Colibrí Rabirrufo
Amazilia tzacatl



Familia: TROCHILIDAE

Distribución en el parque:
Común en toda el área

Tamaño: 9 cm. Pico 2 cm

Características/particularidades:
Especie común en áreas habitadas. En árboles en flor.



Martín Pescador Matraquero
Chloroceryle amazona



Familia: ALCEDINIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque en ambientes acuáticos

Tamaño: 26 - 28 cm

Características/particularidades:
El más grande de los martines pescadores verdes. Posan en ramas junto al agua. Pico bien largo. La hembra no tiene el semicollar rojizo sino verde.

Trogón Violáceo, Palomita de la Virgen ó Soledad
Trogon violaceus



Familia: TROGONIDAE

Distribución en el parque:
Varios ambientes

Tamaño: 24 cm

Características/particularidades:
Confiado. Solitario o parejas. En el **sotobosque** con rápidos vuelos. Plumaje vistoso. Lados de caminos.

Jacamar Colirrufo
Galbula ruficuda



Familia: GALBULIDAE

Distribución en el parque: Principalmente Bosque húmedo pero presente en toda el área.

Tamaño: 23 cm. Pico 5.1 cm

Características/particularidades: Como todos los jacamares, en las ramas del sotobosque. Pequeños y rápidos vuelos.



Pichí Collarejo ó Pichilingo
Pteroglossus torquatus



Familia: RAMPHASTIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo a seco

Tamaño: 41 cm. Pico 9 -11 cm

Características/particularidades: En pequeños grupos de hasta 12 individuos. Se desplazan realizando pequeños vuelos periódicos.



Batará Barrado u Hormiguero
Thamnophilus doliatus



Familia: THAMNOPHILIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque pero principalmente sector húmedo.

Tamaño: 15 cm

Características/particularidades:
Confiados. Balancea la cabeza. Copete semieréctil. Pueden seguir la marcha de las hormigas alimentándose de estas y de sus presas. Hembra rojiza uniforme.

Saltarín Coludo ó Pobretoro
Chiroxiphia lanceolata

Familia: PIPRIDAE

Distribución en el parque:
Varios ambientes.

Tamaño: 13 cm

Características/particularidades:
En pequeños grupos. Oculto, difícil de ver. La hembra de color verduzco uniforme.



Atrapamoscas Picudo
Megarhynchus pitangua



Familia: TYRANNIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 23 cm

Características/particularidades:
Nótese el pico muy ancho y fuerte. Menos frecuente y más oculto que el bichofué gritón.



Sirirí Común
Tyrannus melancholicus



Familia: TYRANNIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 20 cm

Características/particularidades:
Capuchón gris y cola triangular. Se posa en sitios visibles desde donde realiza pequeños vuelos para cazar insectos.



Bichofué Gritón ó Bichajuí
Pitangus sulphuratus



Familia: TYRANNIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 22 cm

Características/particularidades:
Muy común. Ruidoso y agresivo. Similar al atrapamoscas picudo pero pico más delgado.

Atrapamoscas Pechirrojo
Pyrocephalus rubinus



Familia: TYRANNIDAE

Distribución en el parque:
En toda el área

Tamaño: 14 cm

Características/particularidades:
Inconfundible por el capuchón y pecho rojo del macho. En cable, postes y áreas urbanas. La hembra café oscuro.

Golondrina Barranquera
Stelgidopteryx ruficollis

Familia: HIRUNDINIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 13 cm

Características/particularidades:
Golondrina de color pardo. En pequeños grupos cerca de los barrancos donde anida.



Cucarachero Común
Troglodytes aedon



Familia: TROGLODYTIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 10 - 12 cm

Características/particularidades:
Activos y confiados. Cola erecta. Recorre los matorrales frenéticamente. Frecuente cerca de viviendas.

Mirla Ventriblanco ó Zorzal
Turdus leucomelas



Familia: TURDIDAE

Distribución en el parque:
En todo el parque.

Tamaño: 21 - 24 cm

Características/particularidades:
Terrícola y en arbustos. Buenos cantores. Frecuentemente balancean las colas.

Chamón Parásito ó Tordo
Molothrus bonariensis

Familia: ICTERIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 20 cm

Características/particularidades:
Frecuente en bandadas. **Parásita** muchas especies de aves. Brillos violeta. La hembra es pardusca.



Chango Común, María Lucía ó María Mulata
Quiscalus mexicanus

Familia: ICTERIDAE

Distribución en el parque:
Todo el área

Tamaño: 33 - 46 cm

Características/particularidades:
Solitario o en grupo. Agresivo. Característico de toda la costa atlántica y muy común en las áreas urbanas. Las hembras color café con la cola corta.





Chamón Gigante
Scaphidura oryzivora



Familia: ICTERIDAE

Distribución en el parque:
En todo el parque. Más frecuente en áreas húmedas abiertas y cultivadas.

Tamaño: 28-36 cm

Características/particularidades:
Arborícola y terrícola. Puede parasitar los nidos de las oropéndolas. En grupo y solitario.



Carriquí Pechiblanco ó Cuervo Chupahuevos
Cyanocorax affinis



Familia: CORVIDAE

Distribución en el parque:
Todos los bosques del parque.

Tamaño: 33 cm

Características/particularidades:
Gregarios y bulliciosos. Imitadores de sonidos y voces.



Mielero Común ó Azucarero
Coereba flaveola

Familia: COEREBIDAE

Distribución en el parque:
En todo el parque.

Tamaño: 10 cm

Características/particularidades:
Confiado y acrobático. Tiene una notable ceja blanca. En pareja o solitario.





Eufonía Gorgiamarilla, Fraterito ó Azulejito

Euphonia laniirostris



Familia: THRAUPIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 10 cm

Características/particularidades:
En grupos. Come frutos silvestres. La hembra tiene un amarillo más apagado.



Azulejo Común

Thraupis episcopus



Familia: THRAUPIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 16 cm

Características/particularidades:
Confiado. Solitario o en pareja. Frecuente en áreas abiertas y pobladas. Muy conocido.



Azulejo Palmero
Thraupis palmarum



Familia: THRAUPIDAE

Distribución en el parque: Todo el parque.

Tamaño: 16 - 17 cm

Características/particularidades: Confiado. Presente sea en el bosque como en las áreas urbanas.


Espiguero Capuchino ó Silga
Sporophila nigricollis

Familia: FRINGILLIDAE

Distribución en el parque: Todo el parque.

Tamaño: 11 cm

Características/particularidades: Distintivo capuchón negro que llega al pecho solo en el macho. En pequeños grupos con otros espigueros.



Saltator Grisáceo ó Papayero
Saltator coerulescens



Familia: FRINGILLIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 20 cm

Características/particularidades:
Habitualmente buscando y comiendo fruta cerca de asentamientos humanos. Tiene un agradable canto.



Sicalis Coronado ó Canario Basto
Sicalis flaveola



Familia: FRINGILLIDAE

Distribución en el parque:
Todo el parque.

Tamaño: 12 - 14 cm

Características/particularidades:
Frecuentemente en pareja. Se alimentan normalmente en el piso. La hembra es más pequeña y de color más pálido.



Aves que Pueden Observarse en *El Ambiente Acuático y Marino* del Parque Nacional Natural Tayrona



Pelícano ó Alcatráz
Pelecanus occidentalis



Familia: PELECANIDAE

Distribución en el parque: Común en todo el sector marino

Tamaño: 114-137 cm.

Características/particularidades: El ave marina más grande de Colombia. Los juveniles se reconocen por su pecho blanco. Solitario, en grupo pescando o volando en grandes formaciones.



Cormorán Neotropical, Cormorán ó Pato Cuervo
Phalacrocorax brasilianus



Familia: PHALACROCORACIDAE

Distribución en el parque: Relativamente común cerca de las lagunas costeras y en otros ambientes acuáticos.

Tamaño: 60 - 65 cm.

Características/particularidades: Los cormoranes se zambullen en las aguas buscando su presa. Normalmente puede sobresalir del agua solo la cabeza.



Fragata Magnífica, Fragata ó Tijereta de Mar

Fregata magnificens

Familia: FREGATIDAE

Distribución en el parque:
bastante frecuente en el sector marino

Tamaño:
Envergadura de las alas 2.2 - 2.3 m

Características/particularidades:
Planea durante la mayor parte del día. El macho se reconoce durante la época de nidificación (abril-junio en la costa caribe de Colombia) por tener la garganta roja (bolsa gular) que infla cortejando a la hembra. Se alimentan frecuentemente de peces voladores pero también persiguen a los pelícanos para obligarlos a que regurgiten sus presas. Note la cola ahorquillada y las alas puntiagudas.





Garza Blanca ó Garza Real

*Ardea alba**



Familia: ARDEIDAE

Distribución en el parque:
Se puede observar principalmente en las lagunas costeras y en los espejos de agua internos.

Tamaño: 65 cm.

Características/Comportamiento:
Pico amarillo. Solitaria o en pequeños grupos. Es la garza de color blanco más grande del área.



Garcita Rayada, Garcíopolo Verde ó Cargamanteca

Butorides striatus



Familia: ARDEIDAE

Distribución en el parque:
Ambientes acuáticos con vegetación.

Tamaño: 34 - 43 cm

Características/particularidades:
Azulada. Pequeña. En la vegetación a la orilla del agua para cazar.



Garza Patiamarilla, Garza Blanca ó Garza Calzada

Egretta thula



Familia: ARDEIDAE

Distribución en el parque:
Se puede observar en los ambientes acuáticos.

Tamaño: 40 cm

Características/particularidades:
Pico negro y pies amarillos. En pequeños grupos con otras garzas.



Pato Careto, Pato Media-Luna ó Pato Barraquete

Anas discors



Familia: ANATIDAE

Distribución en el parque:
Se puede observar en las lagunas costeras

Tamaño: 30 - 40 cm

Características/particularidades:
El macho tiene un dibujo de media luna en la cara (en el período de reproducción). Vuela rápido en bandadas.



Halcón Pescador ó Águila Pescadora

Pandion haliaetus



Familia: PANDIONIDAE

Distribución en el parque:
Bahías y ensenadas.

Tamaño: 50 - 62 cm

Características/particularidades:
Aves de distribución **cosmopolita** en ambientes marinos como terrestres. Se puede observar mientras hace el "espíritu santo" arriba del agua antes de lanzarse a pico sobre la presa que atrapa con las garras.



Gallineta ó Gallito de Ciénaga
Jacana jacana



Familia: JACANIDAE

Distribución en el parque:
Común en los ambientes acuáticos internos

Tamaño: 22 - 25

Características/particularidades:
Sus largos dedos le permiten sostenerse en los ambientes acuáticos encima de las frágiles plantas acuáticas. Los juveniles blancos con barras negras.



Correlimos Blanco ó Playero Blanco
Calidris alba

Familia: SCOLOPACIDAE

Distribución en el parque:
ambientes acuáticos y marinos.

Tamaño: 19 - 22 cm

Características/particularidades:
Solitarios o en grandes bandadas con otras especies de andarríos y chorlos. Corre en las playas siguiendo las olas. Pequeños.





Andarríos Maculado, Playerito ó Playero Coleador

Actitis macularia

Familia: SCOLOPACIDAE

Distribución en el parque:
Común en los ambientes acuáticos internos

Tamaño: 15 - 20 cm

Características/particularidades:
Pequeños. Notese el continuo balanceo de la parte posterior. En la época migratoria (principalmente septiembre-abril) en grupo con otras especies de andarríos y chorlos.





Andarríos Alinegro ó Chorlo

Catoptrophorus semipalmatus



Familia: SCOLOPACIDAE

Distribución en el parque:
Ambientes acuáticos y marinos

Tamaño: 36 - 41 cm

Características/particularidades:
Presente durante el período septiembre - abril. Solitarios o en pequeños grupos. Balancea menos que otros andarríos.



Cigüeñuela
Himantopus mexicanus



Familia: RECURVIROSTRIDAE

Distribución en el parque:
Ambientes acuáticos internos

Tamaño: 34 - 39 cm

Características/particularidades:
Larguísimas patas rojas. En pequeños grupos.

Gaviotín Real ó Golondrina de Mar
Sterna maxima

Familia: STERNIDAE

Distribución en el parque:
Ambientes marinos

Tamaño: 44 - 50 cm

Características/particularidades:
Uno de los gaviotines más grandes. Gritón y, a veces, en grupos grandes. Pesca clavándose en el mar.



Gaviota Reidora
Larus atricilla



Familia: LARIDAE

Distribución en el parque:
Ambientes marinos

Tamaño: 38 - 43 cm

Características/particularidades:
Gaviota presente en el área durante los meses de noviembre a mayo. En bandadas.



Martín Pescador Mayor
Ceryle torquata



Familia: ALCEDINIDAE


Distribución en el parque:
Todo el parque en ambientes acuáticos y marinos

Tamaño: 38 cm

Características/particularidades:
Solitario. En ramas o postes mirando el agua en la espera de la presa. El más grande de los martines pescadores colombianos.



Aves que Pueden Observarse en *El Matorral Espínoso y El Bosque Seco* del Parque Nacional Natural Tayrona



Aguililla Enana ó Gavilancito
Gampsonyx swainsonii



Familia: ACCIPITRIDAE

Distribución en el parque:
En toda el área, principalmente seca

Tamaño: 20 cm

Características/particularidades:
Unos de los halcones más chicos. Muchas veces en cables y postes. Confiada.



Tortolita Colilarga
Columbina squammata *

Familia: COLUMBIDAE

Distribución en el parque:
Ambientes secos

Tamaño: 18 - 22 cm.

Características/particularidades:
Confiada y **terrícola**. Común en áreas pobladas. Nótese la larga cola.





Perico Carisucio
Aratinga pertinax



Familia: PSITTACIDAE


Distribución en el parque:
Común en área seca e intervenida

Tamaño: 25 cm

Características/particularidades:
En bandadas. En áreas abiertas. Se posa en ramas bajas de árboles.



Esmeralda Piquirroja
Chlorostilbon gibsoni



Familia: TROCHILIDAE

Distribución en el parque:
Bosque seco

Tamaño: 7.6 cm. Pico 1.3 cm

Características/particularidades:
Como otros picaflores, merodea continuamente las flores para buscar el néctar. Muy pequeño.



Bobo Punteado
Hypnelus ruficollis



Familia: BUCCONIDAE

Distribución en el parque:
Bosque seco

Tamaño: 20 cm

Características/particularidades:
Confiados. Se quedan inmóviles en las ramas de los árboles desde donde realizan pequeños vuelos. Normalmente solitarios.



Carpintero Habado
Melanerpes rubricapillus



Familia: PICIDAE

Distribución en el parque:
Bosque seco y manglares.

Tamaño: 18 cm

Características/particularidades:
Fácilmente identificable su presencia por su ruidosa y rápida voz. La hembra no tiene la coronilla roja.



Trepador Pico de Lanza ó Trepatroncos Gusanero

Xiphorhynchus picus



Familia: DENDROCOLAPTIDAE

Distribución en el parque:
Bosque seco y manglares.

Tamaño: 20 cm

Características/particularidades:
Se mueve en el tronco medio y bajo de los árboles como un carpintero. Principalmente solitario.

Hormiguerito Pechinegro

Formicivora grisea



Familia: THAMNOPHILIDAE

Distribución en el parque:
Bosque seco.

Tamaño: 13 cm

Características/particularidades:
Se desplaza entre las ramas del sotobosque moviendo la cola de un lado al otro. La hembra tiene una coloración más pálida.

Hormiguero Pechiblanco
Myrmeciza longipes



Familia: THAMNOPHILIDAE

Distribución en el parque:
Bosque seco

Tamaño: 15 cm

Características/particularidades:
En el estrato bajo del bosque. Furtivo. Generalmente poco común pero frecuente en el parque. Se hace sentir con su canto cuando está presente.



Cucarachero Chupahuevos ó Carraquero
Campylorhynchus griseus

Familia: TROGLODYTIDAE

Distribución en el parque:
Principalmente bosque seco.

Tamaño: 20 cm

Características/particularidades:
En pareja o pequeños grupos ruidosos. **Sotobosque** y áreas habitadas.





Cucarachero Anteado
Thryothorus leucotis



Familia: TROGLODYTIDAE

Distribución en el parque: Todo el parque.

Tamaño: 14 cm

Características/particularidades: En pareja y territoriales. Difícil de observar. **Sotobosque** y suelo.



Turpial Amarillo
Icterus nigrogularis



Familia: ICTERIDAE

Distribución en el parque: Bosque seco.

Tamaño: 22 cm

Características/particularidades: Muy llamativo. En pareja. Canto melodioso.



Aves que Pueden Observarse en "El Bosque Húmedo y El Bosque Nublado" del Parque Nacional Natural Tayrona



Rey de los Gallinazos ó Buitre Rey
Sarcoramphus papa



Familia: CATHARTIDAE

Distribución en el parque: Ocasionalmente sobrevuela los lugares más aislados del bosque del parque

Tamaño: 75 - 80 cm.
Envergadura alas 1.90 cm

Características/particularidades: El más grande buitre de tierras bajas de Sur América. Se puede reconocer mientras planea con otras especies de buitres por la cola y las **remeras** negras contrastadas con el resto del plumaje blanco. Principalmente solitario.

Cangrejero Negro ó Águila Negra
Buteogallus anthracinus



Familia: ACCIPITRIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y cerca de ambientes acuáticos y manglares internos.

Tamaño: 45 - 65 cm

Características/particularidades: Una de las águilas más comunes del parque. La hembra es más grande que el macho. Nótese el barrado blanco de la cola.

Aguililla Tijereta ó Halcón Golondrina

Elanoides forficatus



Familia: ACCIPITRIDAE

Distribución en el parque: Principalmente bosque húmedo y nublado.

Tamaño: 50 - 55 cm.

Características/particularidades: Fácilmente reconocible por la cola ahorquillada y los colores blancos y negros. Sobrevuela el bosque en pequeños grupos. Se alimenta de insectos y pequeños vertebrados que come en vuelo. Difícil verlos posados en ramas.



Aguililla Plomiza ó Gavilán Plomizo

Ictinia plumbea



Familia: ACCIPITRIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo

Tamaño: 35 cm.

Características/particularidades: Halconcito totalmente gris con los ojos rojos. Nótese la cola negra cuadrada. Caza principalmente culebras.



Pava Moñuda ó Pava Garnatera
Penelope purpurascens



Familia: CRACIDAE

Distribución en el parque: Bosques húmedos

Tamaño: 90 cm

Características/particularidades: Bulliciosas en el atardecer o amanecer. Cola larga. Arisca.

Pavón Colombiano ó Paujil Piquiazul
Crax alberti



Familia: CRACIDAE

Distribución en el parque: Bosques húmedos

Tamaño: 91 cm

Características/particularidades: Difícil de ver. En disminución su población en varias regiones.

Guacamaya Verde ó Ara Verde
Ara militaris



Familia: PSITTACIDAE

Distribución en el parque:
Bosque húmedo y nublado.
Ocasional.

Tamaño: 65 - 71 cm.

Características/particularidades:
Grande y verde. Frente roja y pico negro. Solo en el bosque alto. Inconfundible.

Perico Chocolero
Aratinga wagleri



Familia: PSITTACIDAE

Distribución en el parque:
Bosque húmedo y nublado
Ocasional.

Tamaño: 36 cm

Características/particularidades:
Completamente verde con la frente roja. Cola larga. Principalmente en el bosque nublado. En bandadas. En reducción.

Cotorra Cheja ó Cheja Cabeciazul
Pionus menstruus



Familia: PSITTACIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo

Tamaño: 25 cm.

Características/particularidades: Tiene un vuelo linear con fuerte aletazos que hacen que las alas casi se toquen en la parte ventral. Cola corta. Normalmente individuos aislados o parejas en ramas desnudas de árboles.

Bubito Ferrugíneo
Glaucidium brasilianum



Familia: STRIGIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y nublado

Tamaño: 16 cm.

Características/particularidades: Uno de los búhos más pequeños. Bastante diurnos y sin orejas.

Vencejo de Collar ó Vencejo Collarejo Gigante

Streptoprocne zonaris



Familia: APODIDAE


Distribución en el parque: Principalmente bosque húmedo y nublado

Tamaño: 20 cm.

Características/particularidades: Gregario. La especie más grande de vencejo de Colombia. Como todos los vencejos vuela incansablemente. Normalmente se alimentan y se aparean en el aire. Nótese el collar blanco.

Ninfa Coronada

Thalurania colombica



Familia: TROCHILIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y nublado

Tamaño: 8 - 10cm. Pico 2.3 cm

Características/particularidades: Muy territorial. Defiende de otros picaflores su área de alimentación.

Barranquero Coronado
Momotus momota



Familia: MOMOTIDAE

Distribución en el parque:
Bosque húmedo y, ocasionalmente, seco.

Tamaño: 40 cm

Características/particularidades:
Confiado. Típico del **sotobosque** en áreas perturbadas. Nótese la cola que termina con dos **timoneras**.



Tucán del Caribe, Tucán Piquihermoso ó Paletón
Ramphastos sulfuratus

Familia: RAMPHASTIDAE

Distribución en el parque:
Bosque húmedo y nublado.

Tamaño: 48 cm.
Pico entre 12 y 15 cm.

Características/particularidades:
Inconfundible. Único tucán grande del área. En pequeños grupos. Frecuentemente visto en Pueblito.





Carpintero Marcial
Campephilus melanoleucos



Familia: PICIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo.

Tamaño: 36 cm

Características/particularidades: Solitarios o parejas. Típico en grandes árboles muertos. Como casi todos los carpinteros, se puede reconocer por el vuelo ondulado.



Carpintero Real
Dryocopus lineatus



Familia: PICIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo.

Tamaño: 30 - 36 cm

Características/particularidades: Trepan alto y se ocultan a las miradas humanas recorriendo los troncos de los árboles. Rápido y fuerte tamboreo. Notable el copete rojo más reducido en la hembra.



Carpintero Dorado
Piculus chrysochloros



Familia: PICIDAE

Distribución en el parque:
Bosque húmedo.

Tamaño: 21 cm

Características/particularidades:
Confiados y activos. Principalmente solitario. Se puede escuchar a menudo su tamboreo en busca de insectos en la corteza de los árboles. La hembra no tiene el copete rojo.

Xenops Parduzco ó Chamicero Pico de Lanza
Xenops minutus



Familia: FURNARIDAE

Distribución en el parque:
Bosque húmedo.

Tamaño: 12 cm

Características/particularidades:
Se mueve constantemente entre las ramas en pequeños grupos con otras especies de aves. Solitario.

Saltarín Barbiblanco
Manacus manacus



Familia: PIPRIDAE

Distribución en el parque:
Principalmente bosque húmedo.

Tamaño: 10 cm

Características/particularidades:
En bandadas. Confiado. Fácil de ver en el parque. La hembra de color verduzco.

Atrapamoscas Real
*Onychorhynchus mexicanus**



Familia: TYRANNIDAE

Distribución en el parque:
Bosque húmedo

Tamaño: 16 cm

Características/particularidades:
Tiene una cresta oculta que puede extender en forma de abanico. Solitario y difícil de ver.
Principalmente **sotobosque**.

Arrendajo Común
Cacicus cela



Familia: ICTERIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y otros ambientes.

Tamaño: 24 - 28 cm

Características/particularidades: Similar a la oropéndola. Nido colgante. La hembra es más pequeña.

Oropéndola Crestada
Psarocolius decumanus

Familia: ICTERIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y nublado.

Tamaño: 30 - 43 cm

Características/particularidades: En colonia en árboles con los característicos nidos colgantes. Acrobáticos. Inconfundible por el pico claro y la cola amarilla. Buen imitador de los sonidos de otras aves. La hembra es más pequeña que el macho.



Reinita Tropical
Parula pitiayumi



Familia: PARULIDAE

Distribución en el parque:
Bosque húmedo y nublado.

Tamaño: 10 cm

Características/particularidades:
Confiado. Recorre las ramas de los árboles. Solitaria o en pareja.

Azulejo Golondrina
Tersina viridis




Familia: THRAUPIDAE

Distribución en el parque:
Bosque húmedo y nublado.

Tamaño: 15 cm

Características/particularidades:
En grupos a veces numerosos. Muy vistoso. La hembra es verduzca. Nótese el contraste del azul de los machos con el verde de los árboles.

Mielero Patirrojo
Cyanerpes cyaneus



Familia: THRAUPIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y nublado.

Tamaño: 13 cm

Características/particularidades: Frecuentemente en pareja o en grupo. La hembra es verde. Muy activo.

Dacnis Azul ó Mielero Azul
Dacnis cayana

Familia: THRAUPIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y nublado.

Tamaño: 13 cm

Características/particularidades: En pareja o solitaria a veces con otras especies. La hembra es verde pálido.



Asoma Terciopelo ó Cardenal Pico de Plata

Ramphocelus dimidatus

Familia: THRAUPIDAE

Distribución en el parque: Principalmente en bosque húmedo.

Tamaño: 18 cm

Características/particularidades: Especie fácil de ver a la entrada de "El Zaino" del parque. Frecuente en grupo o solitaria en el **sotobosque**.





Tangara Encapuchada ó Azulejo

Tangara cyanoptera



Familia: THRAUPIDAE

Distribución en el parque: Bosque húmedo y nublado. **Ocasional**.

Tamaño: 13 cm

Características/particularidades: Pertenece a un grupo de aves muy coloridas. Frecuente en las copas de árboles o palmeras en bandadas con otras especies.

